

**ENCUESTA DE ACTITUD
DE LOS HOMBRES – VISITA 47**

Número de identificación				

Visitante Número.		
4	7	0

Mes	día	año	
		0	7

TRATAMIENTOS COMBINADOS DE MEDICAMENTOS PARA VIH

Las preguntas de “**tratamientos combinados de medicamentos**” se refieren a combinaciones de medicamentos – incluyendo los inhibidores de proteasas- usados para mantener a la gente que **ya está infectada** con VIH, sin que se enferme de SIDA. Adicionalmente, estos medicamentos también pueden ser usados por una persona con VIH negativo, luego de una posible exposición al VIH (por ejemplo a través de sexo no protegido o por compartir agujas) para tratar de **prevenir** la infección con VIH. Esto se llama “**prevención posexposición**”, o de una forma abreviada: **PPE**. A veces, estos medicamentos pueden ser usados por una persona con VIH negativo, **antes de** una posible exposición al VIH para tratar de **prevenir** la infección con VIH. Esto se llama “**prevención preexposición**”, o de una forma abreviada: **PPRE**.

Q1. ¿Qué tanto ha escuchado acerca del uso de tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección **después de** una posible exposición al VIH (PPE)?

- A. Nada
- B. Poco
- C. Algo
- D. Bastante
- E. Mucho

Q2. ¿Cuántas personas conoce que han usado tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección **después de** una posible exposición al VIH (PPE)?

- A. Ninguna
- B. 1 ó 2
- C. 3 ó más

Q3. ¿Alguna vez ha usado usted tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección **después de** una posible exposición al VIH (PPE)?

- A. No
- B. Sí

Q4. ¿Qué tanto ha escuchado acerca del uso de tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección **antes de** una posible exposición al VIH (PPRE)?

- A. Nada
- B. Poco
- C. Algo
- D. Bastante
- E. Mucho

Q5. ¿Cuántas personas conoce que han usado tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección **antes de** una posible exposición al VIH (PPRE)?

- A. Ninguna
- B. 1 ó 2
- C. 3 ó más

Q6. ¿Alguna vez ha usado usted tratamientos combinados de medicamentos para tratar de prevenir la infección **antes de** una posible exposición al VIH (PPRE)?

- A. No
- B. Sí

Q7A. ¿Han discutido, usted y su compañero principal, reglas para el sexo con otras personas?

- A. No --> **PASE A LA PREG 8**
- B. Sí
- C. No tengo compañero principal --> **PASE A LA PREG 8**

Si la respuesta es “Sí”... Su acuerdo incluye: (marque todas las que apliquen)

- B.** No tener sexo por fuera de su relación
- C.** No tener sexo oral con otro hombre
- D.** No tener sexo anal con otro hombre
- E.** Se discutió el asunto pero no se establecieron reglas
- F.** Sexo anal con otros pero sólo usando condón
- G.** Otro, por favor descríbala: _____

ACTITUDES PERSONALES

Q8. En esta sección hay una serie de preguntas con el mismo formato de respuesta. En una escala de 1 a 5 con 1 igual a “nada de acuerdo” y 5 igual a “completamente de acuerdo”, por favor marque un número para calificar que tanto está usted de acuerdo con *cada* afirmación, dando su primera reacción.

	Nada de acuerdo		Completamente de acuerdo		
	1	2	3	4	5
Q8.1 El VIH ya no es la amenaza que era antes.	1	2	3	4	5
Q8.2 Yo estoy algo mas dispuesto a tomar el riesgo de infectarme, o infectar a alguien más, ahora que los tratamientos combinados de medicamentos están disponibles.	1	2	3	4	5
Q8.3 Yo me considero un “amante al natural” (sexo anal sin condón).	1	2	3	4	5
Q8.4 Debido a los tratamientos combinados de medicamentos, yo estoy menos preocupado de convertirme en VIH + o de infectar a alguien.	1	2	3	4	5
Q8.5 Yo estoy cansado de tener siempre que controlar mi comportamiento sexual.	1	2	3	4	5
Q8.6 El VIH es ahora una enfermedad controlable como la diabetes.	1	2	3	4	5
Q8.7 El placer del sexo piel a piel pesa más que la amenaza de infección o re-infección con VIH.	1	2	3	4	5
Q8.8 Yo encuentro difícil mantener mi compromiso con el sexo seguro.	1	2	3	4	5
Q8.9 A mi me gustan los encuentros sexuales “salvajes-desinhibidos”.	1	2	3	4	5
Q8.10 Me gustan las experiencias y sensaciones sexuales nuevas y excitantes.	1	2	3	4	5
Q8.11 Yo estoy bastante menos preocupado por los “deslices” sexuales ahora que los tratamientos pueden ser dados después del sexo desprotegido.	1	2	3	4	5
Q8.12 La disponibilidad del tratamiento combinado de medicamentos para VIH, ha hecho que me preocupe menos de tener sexo desprotegido.	1	2	3	4	5
Q8.13 La re-infección con VIH es una seria preocupación para mí.	1	2	3	4	5
Q8.14 Tomando el tratamiento combinado de medicamentos, una persona VIH + disminuye el riesgo de infectar con VIH a un compañero.	1	2	3	4	5
Q8.15 Yo estoy menos preocupado por tener sexo anal desprotegido ahora que el tratamiento combinado de medicamentos está disponible.	1	2	3	4	5
Q8.16 Las personas VIH + en quienes el nivel del virus en la sangre es indetectable, es improbable que transmitan el VIH a un compañero sexual.	1	2	3	4	5
Q8.17 Yo estoy interesado en poner a prueba nuevas experiencias sexuales.	1	2	3	4	5
Q8.18 Tomaría mucho esfuerzo mantener mi comportamiento sexual seguro.	1	2	3	4	5
Q8.19 Nadie ha demostrado que los tipos de VIH que harían a alguien resistente a múltiples medicamentos puedan ser transmitidos sexualmente.	1	2	3	4	5
Q8.20 Yo estoy muy preocupado por la transmisión de hepatitis C durante el sexo desprotegido.	1	2	3	4	5